○しろぢくうつぼかび依然トシテ東京ニ産ス

藥學士　落合英二

しろぢくうつぼかび（Diachea leucopoda Rost.）ハ理學博士草野俊助氏ガ明治三十二年ノ夏駒場ノ農科大學（今ノ東京帝國大學農學部）ノ園圃ニ栽培セルおらんだいちごノ葉上ニ發見シ『新撰日本植物圖說』下等隱花類部第一卷ノ第四十五圖版ニ詳細圖說セラレタルニヨリ知ラルヽニ至レルモノナルガ其後東京ニ存在スルヤ否ヤ誰人モ之ヲ報ゼシモノナカリシガ武藏高等學校高等科理科一年生、山本篤氏ガ本年十月本種ヲ東京郊外ナル椎名町路傍ニ於テ端ナク採集セリ余親シク之ヲ檢スルニ胞子囊多クハ破壞シ居タルモ尙少數ノ完全ナルモノ殘存セルニヨリ本種ニ相違ナキヲ認メ得タリ然シテ其著生物ハさはら及ビひむろノ枯枝ナリキ乃チ知ル本種ハ尙廣ク東京附近ニ分布シ居ルモノナルヲ由來本種ハ世界共通ノ種ニシテ敢テ珍トスルニ足ラズト雖ドモ亦決シテ隨處ニ見ルヲ得ベキ普通種ニアラザルハ事實ナリ又本種ノ朝鮮ニモ產スルコトハ同地ヨリノ標本ヲ牧野富太郎氏ニ得テ之ヲ藏スル人アルヲ以テ知ルヲ得タリ

本屬ハ Lister 氏ニ據レバ現時粘菌分類學上フィサルム科（Physaraceae）〔故安田篤氏ノ所謂もじほこりかび科〕ニ屬スルモ往時ハ Spumariaceae（しろぢくうつぼかび科）ニ配屬セシメシコトモアリサレバ故齋田功太郎博士『內外普通植物誌』下等植物篇、故安田篤氏『植物學各論』隱花部等ニハ何レモ草野博士ト均シク Spumariaceae 中ニ包含セシメタリ尙本屬ハ Calcarineae ト Stemonitaceae トノ連鎖ヲナスベキ形態性質ヲ有スルコトハ既ニ Lister 氏ノ唱道セシ所ニシテ粘菌學上甚ダ興味アル次第ナリトス又本屬中本邦ニ產スルモノハ南方（ミナカタ）熊楠氏ノ調查ニ據レバ現時四種一變種ニシテ東京附近ニ產スルハ本種ト麴町區小畔四郎氏宅ニテ同氏ガ

しろぢくうつぼかび依然トシテ東京ニ産ス



しろぢくうつぼかび (Diachea leucopoda Rost.)
新撰日本植物圖說、下等隱花類部、第一卷、第四十五圖版
Diachea 屬ハ 1825 年ニ E. M. Fries 氏ノ設ケタ一屬デ片々ニ毀レル意ノ希臘語ニ基イテ名ケタモノデアル

一昨年創メテ採集セシ Diachea cylindrica Bilgram. トノ二種以外未ダ發見アリシヲ聞カズ、米國ハ五種二變種、又英國ハ三種ノミニシテ世界中ノ合計ハ八種二變種ナリト云フ



自生地ニ於ケルこまくさ (Dicentra pusilla Sieb. et Zucc.) ノ子葉ノ狀

(大正十三年九月信州八ケ岳ニテ岡田喜一撮影)

○一枚シカ無イこまくさノ貝割レ葉

岡田喜一

寡聞ナル小生ガこまくさ (Dicentra pusilla Sieb. et Zucc.) ノ貝割レ葉（甲拆葉（カフタクエフ））即チ子葉 (Cotyledon) ガ單一デ只一枚シカナイ（元來ハ二枚アルベキ筈ノモノダガ）コトヲ知ッタノハ數年前親シク之ヲ播種シテ初メテ經驗シタノデアル其後念ノ爲メ自生地ニ於ケル自然ノ狀態モ知リタク思ッタノデ大正十三年九月ニ武田理學博士ノ驥尾ニ附シテ信州ノ八ケ岳ヘ登山ノ折ニ實地ニ就イテ調ベタ所、幸ニ砂礫ノ間カラ生エテヰタ細長倒披針形ノ該草ノ單子葉ヲ確認スルコトヲ得タ（寫眞參照）



こまくさ (Dicentra pusilla S. et Z.) ノ種子ト甲拆

(略ボ自然大)　(岡田喜一撮影)